

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ

РЕКТОРАТ

ЗАПОВЕД № РК36-4380 / 26.11.2020

На връзка с чл. 63в от Закона за здравето, заповед РД-01-675/25.11.2020 година на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на РБългария и на основание чл.44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет –София,

НАРЕЖДАМ:

I. От 27 ноември 2020 година до 31 януари 2021 година се удължава прилагането на противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 на територията на МУ-София, разпоредени със заповед на Ректора на МУ-София № РК36-4014/22.10.2020 година.

За осигуряване на подходящи среда и условия на труд деканите(ръководители на структурни звена) да проведат необходимите организационни мероприятия за прилагане на допълнителни противоепидемични мерки, в съответствие с вида и характера на дейността им, които да включват:

1. Извършване на редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, съгласно Алгоритъм Приложение №1;

2. Недопускане до работните помещения на лица (служители или посетители) с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

3. Осигуряване на физическа дистанция между лицата в помещенията най-малко от 1.5 метра, при невъзможност-да се носи защитна маска за лице;

4. Да се извърши инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете, съгласно Приложение №2. В сервизните помещения да се осигурят топла течаща вода, сапун и дезинфектант.

5. Да се осигурят лични предпазни средства за всички служителите в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място(защитна маска за лице, шлем, ръкавици и други);

6. Обслужване на посетители да се извършва с използване на защитна маска зад механична прозрачна преграда или предпазен шлем с защитна маска за лице на разстояние от 1.5 метра.

7. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма(надомна работа/работа от разстояние), да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

8. Ръководителите на структурни звена да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и други превантивни мерки и методи на работа, като ограничаване на несъществени контакти и други, за осигуряване на по-добро ниво на защита на работещите.

9. Ръководителите на структурни звена, които предоставят услуги, освен мерките по т. I да организират дейността си, като осигурят:

- контрол на входа по отношение броя на влизащи лица и носенето на защитни маски за лице;

- спазване на физическа дистанция от не по-малко от 1.5 метра;

- дезинфектант за ръце на входа;

- информираност на посетителите за спазване на мерките за физическа дистанция, хигиена на ръцете и задължително носене на защитни маски при посещението в сградата с нагледни материали и информационни табели.

10. Всички лица, намиращи се в закрити обществени места, са задължени да имат поставена защитна маска за еднократна или за многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата от всички лица, съгласно препоръките в Приложение № 3.

11. Всички лица, намиращи се на открити обществени места, при струпване на хора и не е възможно осигуряване на физическа дистанция от 1.5 метра са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или за многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата от всички лица, съгласно препоръките в Приложение № 3.

12. Изключение от задължението по т.11 се допуска:

а/ в местата за хранене и питейни заведения;

б/ при участие в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници.

13. Противоепидемичните мерки за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние се прилага за всички лица, които не са от едно семейство или домакинство на открити обществени места в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки.

14. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане на територията на структурните звена на МУ- София.

II. Ръководителите на структурни звена, съгласно функционалната си компетентност, със своя заповед да организират изпълнението и контрола по прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

III. Заповед № РК 36-4014/22.10.2020 г. се отменя.

IV. Настоящата заповед влиза в сила от 27.11.2020 г.

1. Ръководителите на структурни звена до 04.12.2020 год. да изпратят копия от своите заповеди в Ректората на МУ- София на вниманието на експерт СУКПБ инж. М. Дашинов.

2. До 06.01.2021 год. (съответно 01.02.2021 г.) да се изготвят отчети за изпълнението на противоепидемичните мерки през съответния изминал месец и се изпратят в Ректората на МУ-София на вниманието на експерт СУКПБ инж. М. Дашинов.

3. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт СУКПБ в МУ-София, Ректорат.

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

Приложения:

1. Приложение № 1 - Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение;
2. Приложение №2 Инструкции за правилна хигиена на ръцете
3. Приложение №3 Инструкция за правилно носене на лицева маска.

Приложение № 1

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни” и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена” и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при пократко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бугони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1 .1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3. 3. Мажите повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.22. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.23. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на действие.

3.24. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение № 2 към т. 1, буква „в“

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винам:

- а) когато са видимо замърсени
- б) след кихане или кашляне;
- в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
- г) преди хранене;
- д) след ползване на тоалетна;
- е) след досег с животни или техни изпражнения;
- ж) при непосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на пашите, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение М 3 към т. 5

Инструкция за правилно носене на лицева маска

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) и се избягва докосването на предната ѝ страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
 - а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °C за не по-малко от 20 минути; или
 - б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60° C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.